n.° 50.

Observation sur l'exfoliation d'une portion cylindrique du tibia

Academie nationale de medecine

Un jeune homme âgé de 13 ans, eut un eresipel phlegmoneux depuis le genoux jusqu'à la partie moyenne et inferieure de la jambe gauche, et se termina par la suppuration: a l'ouverture du depot, on s'appercut que le perioste avoit esté entierement detruit et que la matiere flottoit de toute part sur le tibia, dans toute l'etendue qu'avoit occupé l'inflammation; nous attendimes l'exfoliation pendant l'espace de six semaines, nous crumes la prourer par les remedes ordinaires, et au lieu d'une exfoliation superficielle, nous sentimes tout le corps de l'os s'ebranler; nous debridames en haut et en bas pour en faciliter la sortie, et nous tirames une portion cylindrique de sept pouces qui egaloit la moitié de la longeur totale; cette operation fut faite un peu tard parceque les parens inquiets la redoutoient et qu'on contestoit sur la nature du mal, et sur l'etendüe de l'exfoliation: il survint encore

ARC 61 n° 78

a La suite deux petis depots au dessous du genoux qui donnerent issüe a quelques portions d'os Cariés et qui terminerent La Cure.

si on Eut fait a tems Cette operation, on Eut pourvû a un inconvenient; Chaque Extremité de l'os qui devoit s'exfolier et qui Couvroit Les Extremités de L'os sain, Eloignoit Les sucs osseux de Leur direction naturelle, et La nouvelle ossification qui s'est reparée dans toute L'etendue de La portion perdüe, se fit de Coté en dedans: quoique La jambe soit un peu arquée, La substance reparée est aussi solide que L'estoit L'os principal, et La jambe n'a rien perdû de sa Liberté.

L'Academie qui fait une Collection de faits rares, fera tel usage qu'il Lui plaira de cette observation.

Chambon